


Lösung zu der Einführung in die mehrstufigen Zufallsexperimente

Gegeben ist ein Behälter mit 6 blaue und 4 gelben Kugeln. Es wird zweimal gezogen, die Kugeln werden nach dem Ziehen wieder zurückgelegt.

1. Zeichnen Sie ein Baumdiagramm!



- a. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass nur blaue Kugeln gezogen werden!

$$\frac{6}{10} \cdot \frac{6}{10} = \frac{36}{100} = 0,36 \Rightarrow \text{Die Wahrscheinlichkeit beträgt } 36\%.$$
 - b. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass nur gelbe Kugeln gezogen werden!

$$\frac{4}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{16}{100} = 0,16 \Rightarrow \text{Die Wahrscheinlichkeit beträgt } 16\%.$$
 - c. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass zuerst eine blaue und dann eine gelbe Kugel gezogen wird!


$$\frac{6}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{24}{100} = 0,24 \Rightarrow \text{Die Wahrscheinlichkeit beträgt } 24\%.$$
 - d. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass zuerst eine gelbe und dann eine blaue Kugel gezogen wird!

$$\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{10} = \frac{24}{100} = 0,24 \Rightarrow \text{Die Wahrscheinlichkeit beträgt } 24\%.$$
 - e. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass insgesamt eine gelbe und eine blaue Kugel gezogen werden!

$$\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{10} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{10} = \frac{48}{100} = 0,48 \Rightarrow \text{Die Wahrscheinlichkeit beträgt } 48\%.$$
2. Formulieren Sie die beiden Pfadregeln!
 Die Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses erhält man, indem **man die Wahrscheinlichkeiten entlang des Pfades multipliziert**.

Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses erhält man, indem **man die Wahrscheinlichkeiten der entsprechenden Ergebnisse addiert.**

3. Zeichnen Sie ein Baumdiagramm für den Fall, dass die Kugeln nach dem Ziehen **nicht** wieder zurückgelegt werden! Rechnen Sie die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten aus Nr. 1 aus!



- a. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass nur blaue Kugeln gezogen werden!
 $\frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \frac{1}{3} = 0,3 \Rightarrow$ Die Wahrscheinlichkeit beträgt ca. 33,33%.
- b. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass nur gelbe Kugeln gezogen werden!
 $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{2}{15} = 0,1\bar{3} \Rightarrow$ Die Wahrscheinlichkeit beträgt ca. 13,33%.
- c. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass zuerst eine blaue und dann eine gelbe Kugel gezogen wird!
 $\frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{15} = 0,2\bar{6} \Rightarrow$ Die Wahrscheinlichkeit beträgt ca. 26,67%.
- d. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass zuerst eine gelbe und dann eine blaue Kugel gezogen wird!
 $\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{4}{15} = 0,2\bar{6} \Rightarrow$ Die Wahrscheinlichkeit beträgt ca. 26,67%.
- e. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass insgesamt eine gelbe und eine blaue Kugel gezogen werden!
 $\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{48}{90} = 0,5\bar{3} \Rightarrow$ Die Wahrscheinlichkeit beträgt ca. 53,33%.